

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ポラツズマブ ベドチン+R-CHP(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

投与量設定(点滴) リツキシマブ 375mg/m²(day1)、ホウ化ベドチン(ホウラツズマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day2)、ドキシリジン 50mg/m²(day2)、インドキサジン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day2)

診療科名 血液 投与量設定(内服) プレドニゾン(プレドニゾン) 100mg/body(day2-6)、加ナール(アミノフェン) 500mg/day(day1,2)、ホウラミン(d-加ルニエニラミン酸塩) 2mg/day(day1,2)

管理コード 200023 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 6					
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★プレドニゾン内服 (ホウ化ベドチン投与60分前までに)★ ★加ナール,ホウラミン内服 (リツキシマブ,ホウ化ベドチン投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	側管静注	時間 : _____			リル・コチン注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間 : 30分			バロセトロン点滴静注バツク 0.75mg 50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間 : _____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキシマブ BS注 生理食塩液 (希釈用)	375mg/m ² mL	○								
5	点滴静注	時間 : 90分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルターライン使用	●	ホウ化ベドチン注 注射用水PL「フリ」(20mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1管 1瓶		○							
6	点滴静注	時間 : 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フリ」 50mL	1瓶		○							
7	点滴静注	時間 : 30分	積算値チェック	●	ドキシリジン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○							
8	点滴静注	時間 : 2時間		●	インドキサジン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○							
	内服	時間 : _____			加ナール ホウラミン	500mg/day 2mg/day	○	○							
	内服	時間 : _____			プレドニゾン	60mg/m ²		○	...	○					