

化学療法レジメン

レジメン名 **【消】ペムブロリズマブ+GEM+CDDP**

上限:8コース

レジメンの概要 治癒切除不能な胆道癌

診療科名 消化器

投与量設定 キイトルダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body(day1)、シスプラチン 25mg/m²(day1,8)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)

管理コード 100214

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8						
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注 末梢メイン	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg グラセトリ点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○		○						
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分	積算値チェック	●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	25mg/m ² 1袋	○		○						
6	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○		○						
7	点滴静注 末梢側管	時間 : 1時間30分	ゲムシタビンと同時に 側管より		硫酸Mg補正液1mEq/mL リユージェンF注 500mL	1管 1袋	○		○						

8クール施行後
【消】ペムブロリズマブ+GEM
(100215)へ移行