

化学療法レジメン

レジメン名【消】ベバシズマブ+FOLFOX6

レジメンの概要大腸癌

診療科名消化器

管理コード100005

投与量設定

インターバル日数14

（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	CVポート メイン	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注	5mg/kg	○								
					生理食塩液（希釈用）	1瓶									
3	CVポート メイン	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					グラセトン点滴静注パック 1mg/50mL	1袋									
4	CVポート 側管	時間： 2時間	オキサリプラチンと同時投与		レボリナート注	200mg/m ²	○								
					大塚糖液5%(250mLリットパック)	1袋									
5	CVポート メイン	時間： 2時間	レボリナートと同時投与 全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注	85mg/m ²	○								
					ブドウ糖液5%（希釈用）	1袋									
6	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
7	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○								
					生理食塩液（希釈用）	1瓶									