

化学療法レジメン

レジメン名 【耳】セツキシマブ+PTX(2クール目以降)

レジメンの概要 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

診療科名 耳鼻咽喉

投与量設定 アービタックス(セツキシマブ) 250mg/m²(day1)、パクリタセル 80mg/m²(day1)

管理コード 400061

インターバル日数 7 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○									
					ホーラミン注5mg	2管										
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
3	点滴静注	時間： 1時間	全量250mLに調製	●	アービタックス注	250mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										
4	点滴静注	時間： 30分			生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
5	点滴静注	時間： 30分			ファモチジン注射用20mg	1管	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
6	点滴静注	時間： 1時間	フィルターライン使用	●	パクリタセル注	80mg/m ²	○									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										