

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ポラツズマブ ベドチン+BR(2クール目以降)

上限：5クール

レジメンの概要 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

投与量設定(点滴) リツキシマブ 375mg/m²(day1)、ホ[®]ラ化[®]（ホ[®]ラツズマブ ベドチン） 1.8mg/kg(day1)、ベンダ[®]ムスチン 90mg/m²(day1,2)

診療科名 血液 投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1)、ホ[®]ラミン(d-クルルフェニミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200022 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2								
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホ [®] ラミン内服 (リツキシマブ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間：30分			リル・コテフ注射用100mg	1瓶	○									
					バ [®] ロ/セトロン点滴静注バ [®] ッグ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間：_____	100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキシマブ BS注	375mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	mL										
4	点滴静注	時間：30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
5	点滴静注	時間：30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルターライン使用	●	ホ [®] ラ化 [®] 注	1.8mg/kg	○									
					注射用水PL「フー」(20mL)	1管										
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
6	点滴静注	時間：30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
7	点滴静注	時間：10分		●	ベンダ [®] ムスチン注	90mg/m ²	○	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
	内服	時間：_____			カナール	500mg/day	○									
					ホ [®] ラミン	2mg/day										

地方独立行政法人 新小山市民病院