

化学療法レジメン

レジメン名

【血】ダウノルビシン+シタラビン(地固め)

上限：2クール

レジメンの概要

高リスク急性骨髄性白血病

診療科名

血液

投与量設定

ビキセオス(ダウノルビシン・シタラビン リポソーム製剤) 65ユニット(ダウノルビシン/シタラビンとして29mg/65mg)/㎡(Day1,3)

管理コード

200182

インターバル日数

35 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 3						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
2	点滴静注	時間：30分			アホリス点滴静注235m g	1瓶	○			最後の寛解導入療法開始から 5～8週後に当レジメンを施行					
					パロノセトロン点滴静注パッグ®0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間：1時間30分	フィルター不可 注射用水の欄:total量を記載 1瓶を注射用水19mLで溶解 溶解後総量20mL	●	ビキセオス配合静注用	29mg/㎡	○		○						
					注射用水(100mL)	1瓶	積算値チェック								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									

ダウノルビシンとして