

化学療法レジメン

レジメン名 【血】エロツズマブ+Rd(3クール目以降)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) IΔ7°リシテイ(IΔツズマブ°) 10mg/kg(day1,15)

投与量設定(内服) レバミト°(レナリト°ミト°) 25mg(day1-21)、レナデックス(デキサメタゾン) 28mg(day1,15)40mg(day8,22)、

診療科名 血液

加ナール(アトアミノフィン) 500mg(day1,15)、ホ°ラミン(d-クルルフェニルアラニン酸塩) 2mg(day1,15)

管理コード 200058

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★加ナール,ホ°ラミン内服 (IΔ7°リシテイ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1管	○				○			
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○				○			
					ファモチジン注射用20mg	1管								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶								
3	点滴静注	時間 : 45分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○				○			
4	点滴静注	時間 : _____	フィルターライン使用 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:25mg/mL 必要量を抜き取り希釈 投与速度:300mL/h	●	IΔ7°リシテイ注	10mg/kg	○				○			
					注射用水(100mL7°プラスチックボトル)	1瓶								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋								
	内服	時間 : _____			レナデックス	28mg/day	○				○			
					加ナール	500mg/day								
					ホ°ラミン	2mg/day								
	内服	時間 : _____			レナデックス	40mg/day			○					○
	内服	時間 : _____		●	レバミト°	25mg/day	○	...	...	...	...	...	○	

地方独立行政法人 新小山市民病院