

化学療法レジメン

レジメン名 【血】オビヌツズマブ+ベンダムスチン(1クール目)

上限：1クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定(点滴) ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1,8,15)、ベンダムスチン 90mg/m²(day1,2)

診療科名 血液

投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,8,15)、ホアラミン(d-カルシウムトリスリン酸塩) 2mg/day(day1,8,15)

管理コード 200145

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 8	...	Day 15			
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール、ホアラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○		○		○			
2	点滴静注	時間：30分	★ガザイバ投与60分前までに投与完了★		リル・メトロール静注用40mg 生理食塩液PL「フー」50mL	2瓶 1瓶	○			○		○			
3	点滴静注	時間：30分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
4	点滴静注	時間：30分			パロセトロン点滴静注パグ0.75mg 50mL	1袋	○								
5	点滴静注	時間：1時間			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶				○		○			
6	点滴静注	時間：4時間20分 ※day1 時間：3時間15分 ※day8,15	day1:12mL/hで開始 30分毎に12mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで day8,15:25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで ★リル・メトロール投与完了より60分空ける★ 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液（希釈用）	1000mg/body 1袋	○			○		○			
7	点滴静注	時間：30分			生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○								
8	点滴静注	時間：10分	★ガザイバ投与完了より30分空ける★	●	ベンダムスチン注 生理食塩液PL「フー」50mL	90mg/m ² 1瓶	○	○							
	内服	時間：_____			カナール ホアラミン	500mg/day 2mg/day	○			○		○			