

化学療法レジメン

レジメン名 【泌】ETP+CDDP

レジメンの概要 胚細胞腫瘍(精巣腫瘍)

投与量設定(点滴) シス[°]ラチン 20mg/m²(day1)、イト[°]シト[°] 100mg/m²(day1)

診療科名 泌尿器 投与量設定(内服) ア[°]レ[°]タト 125mg(day1) 80mg(day2,3)

管理コード 300021 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リテ [°] ム3A輸液(500mL)	1袋		○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00				
2	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分	★ア [°] レ [°] タト内服(3日間連投 1日目:シス [°] ラチン投与1～1.5時間前 2日目以降:午前中)★		リユー [°] ゲンF注 500mL	1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			デ [°] サト注射液6.6mg バ [°] ロ [°] レ [°] ロ [°] 点滴静注バ [°] ツク [°] 0.75mg 50mL	1.5瓶 1袋	○ 10:30								
4	点滴静注 末梢側管	時間： 30分			デ [°] サト注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶		○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30				
5	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間		●	シス [°] ラチン注 大塚生食注(500mL袋)	20mg/m ² 1袋	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	積算値チェック			
6	点滴静注 末梢側管	時間： 15分			カ [°] セ [°] ト注射液20mg 生理食塩液PL「フー」 50mL	0.5管 1瓶	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00				
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間		●	イト [°] シト [°] 注 大塚生食注(500mL袋)	100mg/m ² 1袋	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00				
8	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			ラクテックG輸液(500mL袋)	1袋	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00				
9	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リテ [°] ム3A輸液(500mL)	1袋	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00				
10	点滴静注 末梢側管	時間： 15分			カ [°] セ [°] ト注射液20mg 生理食塩液PL「フー」 50mL	0.5管 1瓶	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00				
11	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リユー [°] ゲンF注 500mL	1瓶	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00				
	内服	時間：			ア [°] レ [°] タト		○ 125mg	○ 80mg	○ 80mg						