

化学療法レジメン

レジメン名【消】ベバシズマブ+FOLFIRI

レジメンの概要大腸癌

診療科名消化器

管理コード100015

投与量設定

インターバル日数14

（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

ベバシズマブ 5mg/kg(day1)、レボリナト 200mg/m²(day1)、イリリカ 150mg/m²(day1)、フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注	5mg/kg	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										
3	CVポート メイン	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○									
					パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋										
4	CVポート 側管	時間： 2時間	イリリカと同時投与		レボリナト注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
5	CVポート メイン	時間： 2時間	レボリナトと同時投与	●	イリリカ注	150mg/m ²	○									
					ブドウ糖液5%（希釈用）	1袋										
6	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フソ」 50mL	1瓶										
7	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										