

化学療法レジメン

レジメン名 【血】CHOP

上限：8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) ザンロビン(ビソナリフィン) 1.4mg/m²(day1)、ドキシタキソン 50mg/m²(day1)、インドキサン(シクロホファミド) 750mg/m²(day1)

診療科名 血液

投与量設定(内服) フロドコニ(フロドコニ) 60mg/m²(day1-5)

管理コード 200000

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 5						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：15分			パロメトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
3	点滴静注	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	ザンロビン注 生理食塩液PL「フー」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶	○								
4	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	ドキシタキソン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶	○								
5	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋	○								
	内服	時間：_____			フロドコニ	60mg/m ²	○	...	○						