

化学療法レジメン

レジメン名【血】《皮下》AZA+ベネトクラクス

レジメンの概要急性骨髄性白血病

投与量設定(点滴)アザシジン 75mg/m²(day1-7)

投与量設定(内服)ベネレクタ(ベネトクラクス) 400mg(day1-28)※1クール目のみ100mg(day1),200mg(day2),400mg(day3-28)、

診療科名血液

カイトリル(グラセトン) 2mg/day(day1-7)

管理コード200067

インターバル日数28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) ※インターバル日数は原則28日ですが休日等を考慮して21日で登録してあります。

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	...	Day 28
1	皮下注射	時間：_____	注射用水の欄:total量を記載	●	アザシジン注(皮下用)	75mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○		
			溶解後濃度:25mg/mL		注射用水PL「フー」(20mL)	1管									
			必要量を抜き取り希釈												
			調製から1時間以内に投与												
	内服	時間：_____	1クール目day1：100mg		ベネレクタ	400mg/day	○	○	○	○	○	○	○	...	○
			1クール目day2：200mg												
	内服	時間：_____			カイトリル	2mg/day	○	○	○	○	○	○	○		