

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】デュルバルマブ+PEM+CBDCA

上限：4クール

レジメンの概要 非小細胞肺癌における術前補助療法

診療科名 呼吸器 投与量設定(注射) イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body(day1)、 Λ° メトレクト 500mg/m²(day1)、カレゾラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード 250240 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 1時間	フィルターライン使用	●	イミフィンジ 注 大塚生食注(250mL袋)	1500mg/body 1袋	○									
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間： 30分			デキサート注射液6.6mg アカリ点静注235m g Λ° メトレクト点静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1瓶 1袋	○									
5	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	Λ° メトレクト 注 大塚生食注(100mL瓶)	500mg/m ² 1瓶	○									
6	点滴静注	時間： 1時間		●	カレゾラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	AUC=4~6 1袋	○									

イミフィンジ(デュルバルマブ) :
体重30kg以下には未適応