

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+DEX(2クール目以降)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) サークサ(イサツキシマブ) 20mg/kg(day1,15)

投与量設定(内服) レデックス(デキサメタゾン) 20-40mg/day(day1,8,15,22)、カナル(アセトアミノフィン) 500mg/day(day1,15)、

ホーラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1,15)

診療科名 血液

管理コード 200203

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間        | 用法・その他                                                                     | 癌 | 薬品名称          | 用量/単位       | Day 1 | ... | Day 8 | ... | Day 15 | ... | Day 22 |  |  |
|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間 : _____  | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>フィルターライン使用<br>★レデックス、カナル、ホーラミン内服<br>(サークサ投与30分前までに)★ |   | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶          | ○     |     |       |     | ○      |     |        |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間 : 2時間30分 | 全量500mLに調製<br>フィルターライン使用<br>200mL/h                                        | ● | サークサ注         | 20mg/kg     | ○     |     |       |     | ○      |     |        |  |  |
|    | 内服      | 時間 : _____  |                                                                            |   | 生理食塩液 (希釈用)   | 1袋          |       |     |       |     |        |     |        |  |  |
|    | 内服      | 時間 : _____  |                                                                            |   | レデックス         | 20-40mg/day | ○     |     | ○     |     | ○      |     | ○      |  |  |
|    | 内服      | 時間 : _____  |                                                                            |   | カナル           | 500mg/day   | ○     |     |       |     | ○      |     |        |  |  |
|    |         |             |                                                                            |   | ホーラミン         | 2mg/day     |       |     |       |     |        |     |        |  |  |