

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ペムブロリズマブ+SP

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(注射) キイトルダ[®](ペムブロリズマブ)200mg/body(day1)、シタラチン 60mg/m²(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ティエスワン(テガフル・ギマシル・チラシルK)80-120mg/day1日2回(day1-14) ※ティエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100216 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day0	Day 1	Day 2	Day 3	...	Day 14			
1	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管		○ 6:00							
2	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間			大塚生食注(500mL袋)	1袋		○ 7:30							
3	点滴静注 末梢側管	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○							
4	点滴静注 末梢側管	時間：30分			デキスト注射液6.6mg	1.5瓶		○ 8:30							
					アドカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロキサロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
5	点滴静注 末梢側管	時間：30分			デキスト注射液6.6mg	1瓶			○ 10:00	○ 10:00					
6	点滴静注 末梢側管	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ [®] 注	200mg/body		○ 9:00							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
7	点滴静注 末梢側管	時間：2時間			マニトールS注射液300mL	1袋		○ 9:30							
8	点滴静注 末梢側管	時間：2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シタラチン注	60mg/m ²		○ 11:30	積算値チェック						
					生理食塩液（希釈用）	1袋									
9	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			リューゲンF注 500mL	1袋		○ 13:30	○ 10:30	○ 10:30					
10	点滴静注 末梢メイン	時間：4時間			リューゲンF注 500mL	1袋	○ 17:00								
11	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			フィジール140輸液 500ml	1袋		○ 15:30	○ 12:30	○ 12:30					
12	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			リルデム3A輸液(500mL)	1袋		○ 17:30	○ 14:30	○ 14:30					
13	点滴静注 末梢メイン	時間：_____	ルートフラッシュ ロック用		生食液NS 20mL	1管		○ 19:30	○ 16:30						
14	点滴静注 末梢メイン	時間：4時間			リルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 21:00								
15	点滴静注 末梢メイン	時間：5時間			生理食塩液(500mL袋)	1袋	○ 1:00								
	内服	時間：_____		●	ティエスワン	80-120mg/day		○	...	...	...	○			

【ティエスワン】

地方独立行政法人 新小山市民病院

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。

これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回