

化学療法レジメン

レジメン名【血】エプコリタマブ(10クール目以降)

レジメンの概要再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫,高悪性度B細胞リンパ腫,原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫),
再発又は難治性の濾胞性リンパ腫

投与量設定（注射）I7°キリ(I7°コリタマブ)48mg/body(day1)
※前回投与時にGrade2又は3のサイトカイン放出症候群が現れた場合のみ デキサート(デキサメタゾン) 16.5mg/body(day1-4)

診療科名血液投与量設定（内服）カロナール(アセトアミノフェン) 650-1000mg(day1)、ホ°ラミン(d-クルフェニラミン酸塩)2mg/day(day1)

管理コード200173インターバル日数28（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2-4								
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホ°ラミン内服 (I7°キリ投与30-120分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間：15分			デキサート注射液6.6mg 生理食塩液PL「フソ」50mL	2.5瓶 1瓶	○	○								
3	点滴静注	時間：30分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
4	皮下注射	時間：_____	★カロナール,ホ°ラミン内服 (I7°キリ投与30-120分前までに)★	●	I7°キリ注	48mg/body	○									
	内服	時間：_____			カロナール ホ°ラミン	650-1000mg/day 2mg/day	○									

地方独立行政法人 新小山市民病院

前回投与時にGrade2又は3のサイトカイン放出症候群が
現れなかった場合はRp1-3は削除、Rp4のみ投与する。
※ホ°ラミン、カロナールは毎回投与する。