

化学療法レジメン

レジメン名 【血】CHASE
レジメンの概要 悪性リンパ腫

上限：6クール

診療科名 血液
管理コード 200011
投与量設定(点滴) デキサト(デキサメタゾン) 33mg/body(day1-3)、インドキサ(シロホスファミド) 1200mg/m²(day1)、シタレン 2000mg/m²(day2-3)、イトネシト 100mg/m²(day1-3)
投与量設定(点眼) day2起床時-day4就寝時、1日4回(6時,12時,18時,眠前)ステロイド点眼を両眼に行う(副作用予防)
インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	Day3	Day 4				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○					
2	点滴静注	時間：30分			パロメトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋	○							
					アカリ点点滴静注235mg	1瓶	9:30							
3	点滴静注	時間：30分			デキサト注射液6.6mg	5瓶	○	○	○					
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	10:00	10:00	10:00					
4	点滴静注	時間：3時間		●	インドキサ注	1200mg/m ²	○							
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	10:30							
5	点滴静注	時間：3時間	全量500mLに調製	●	シタレン注高用量	2000mg/m ²		○	○					
					生理食塩液（希釈用）	1袋		10:30	10:30					
6	点滴静注	時間：2時間	※用量200mgを超える 場合は50倍希釈する	●	イトネシト注	100mg/m ²	○	○	○					
					大塚糖液5%(500mLソフトパック)	1袋	13:30	13:30	13:30					
	内服	時間：_____			ステロイド点眼			○	...	○				