

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ(2クール目以降)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) サークサ(イサツキシマブ) 20mg/kg(day1,15)

診療科名 血液 投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,15)、ホ°ラミン(d-カルフェニラミン塩) 2mg/day(day1,15)

管理コード 200205 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 15						
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★カナール,ホ°ラミン内服 (サークサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
2	側管静注	時間 : _____	サークサ投与30分前		リル・コ・テフ注射用100mg	1瓶	○		○						
3	点滴静注	時間 : <u>2時間30分</u>	全量500mLに調製 フィルターライン使用 200mL/hで投与	●	サークサ注	20mg/kg	○		○						
	内服	時間 : _____			生理食塩液 (希釈用)	1袋									
					カナール	500mg/day	○		○						
					ホ°ラミン	2mg/day									