

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ゾルベツキシマブ+CapeOX(2クール目以降)

レジメンの概要 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(点滴) ビーイ(ゾルベツキシマブ) 600mg/m²(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ゼロダ(カペシチン) 2400-4200mg/day1日2回(day1-14) ※ゼロダ：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100033 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14							
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アピラス点滴静注235mg	1瓶										
					ホラミン注5mg	2管										
					パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間： _____	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 2.0mg/mLに希釈調製して使用 0-30分: 50mL/h 30-60分: 100mL/h 60分以降: 200mL/h 3クール目以降は医師指示を 参照し2時間で投与可	● ビーイ注	600mg/m ²		○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					生理食塩液 (希釈用)	mL										
5	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
6	点滴静注	時間： 2時間	全量500mLに調製	● オキサリプラチン注	130mg/m ²		○									
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1袋										
	内服	時間： _____		● ゼロダ	2400-4200mg/day		○	...	○							

【ゼロダ】

地方独立行政法人 新小山市民病院

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。

これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36㎡未満	1,200mg
1.36㎡以上1.66㎡未満	1,500mg
1.66㎡以上1.96㎡未満	1,800mg
1.96㎡以上	2,100mg