

化学療法レジメン

レジメン名【消】SP

レジメンの概要胃癌

投与量設定(点滴)シス[®]ラチン60mg/m²(day8)

投与量設定(内服)ティーエスワン(テガフル・キメラシル・ホラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-21) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day22朝

管理コード100075

インターバル日数35 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	...	Day 21	
1	点滴静注	時間： 3時間			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管				○					
					大塚生食注(500mL袋)	1袋				6:00					
2	点滴静注	時間： 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋				○					
										9:00					
3	点滴静注	時間： 30分			デ [®] サート注射液6.6mg	1.5瓶				○					
					ア [®] カリス点滴静注235mg	1瓶				10:00					
					パ [®] ロ/セ [®] ト [®] 点滴静注パ [®] ック [®] 0.75mg/50mL	1袋									
4	点滴静注	時間： 2時間			マンニトールS注射液300mL	1袋				○					
										10:30					
5	点滴静注	時間： 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シス [®] ラチン注	60mg/m ²				○					
					生理食塩液（希釈用）	1袋				12:30					
6	点滴静注	時間： 30分			デ [®] サート注射液6.6mg	1瓶					○	○			
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶					10:00	10:00			
7	点滴静注	時間： 2時間			フィジオ140輸液 500mL	1袋				○	○	○			
										14:30	10:30	10:30			
8	点滴静注	時間： 4時間			リユーゲンF注 500mL	1袋			○						
									17:00						
9	点滴静注	時間： 2時間			リルデ [®] Δ3A輸液(500mL)	1袋				○	○	○			
										16:30	12:30	12:30			
10	点滴静注	時間： 2時間			フィジオ140輸液 500mL	1袋					○	○			
											14:30	14:30			
11	点滴静注	時間：	ルートフラッシュ		生食液NS 20mL	1管				○	○				
										18:30	16:30				
12	点滴静注	時間： 4時間			リルデ [®] Δ3A輸液(500mL)	1袋			○						
									21:00						
13	点滴静注	時間： 5時間			生理食塩液(500mL袋)	1袋			○						
									1:00						
	内服	時間：		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	...	...	...	...	...	○	

地方独立行政法人 新小山市市民病院

【ティーエスワン】

B法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、21日間連日経口投与し、その後14日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回