

化学療法レジメン

レジメン名 **【血】オビヌツズマブ+CHOP(2-6クール目)**

上限：5クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定(点滴) ガザイブ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1)、オシメルチン(ヒンクリスチン) 1.4mg/m²(day2)、

ドキシルビシン 50mg/m²(day2)、インドキサシン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day2)

診療科名 血液

投与量設定(内服) プレドニソン(プレドニゾロン) 100mg/day(day2-6)、加ナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1)、ホウラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200141

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 6					
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★加ナール,ホウラミン内服 (ガザイブ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間：2時間20分	0-30分：25mL/h 30-60分：75mL/h 60分以降：150mL/h 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイブ注 生理食塩液（希釈用）	1000mg/body 1袋	○								
3	点滴静注	時間：30分			バロメトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	オシメルチン注 生理食塩液PL「フー」 50mL	1.4mg/m ² 1瓶		○							
5	点滴静注	時間：30分	積算値チェック	●	ドキシルビシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○							
6	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサシン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○							
	内服	時間：_____			加ナール ホウラミン	500mg/day 2mg/day	○								
	内服	時間：_____			プレドニソン	100mg/day		○	...	○					