

化学療法レジメン

レジメン名 【血】オビヌツズマブ+ベンダムスチン(2-6クール目)

上限：5クール

レジメンの概要 CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量設定(点滴) ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1)、ベンダムスチン 90mg/m²(day1,2)

診療科名 血液

投与量設定(内服) カナール(アセトアミノフェン) 500mg/day(day1)、ホパラミン(d-カルルフェニルアラニン酸塩) 2mg/day(day1)

管理コード 200146

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2								
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホパラミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	点滴静注	時間：30分			パロノセトロン点滴静注パグ 0.75mg 50mL	1袋	○									
3	点滴静注	時間：2時間20分	0-30分：25mL/h 30-60分：75mL/h 60分以降：150mL/h 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注 生理食塩液（希釈用）	1000mg/body 1袋	○									
4	点滴静注	時間：30分			生理食塩液PL「フソ」50mL	1瓶	○									
5	点滴静注	時間：10分	★ガザイバ投与完了より30分空ける★	●	ベンダムスチン注 生理食塩液PL「フソ」50mL	90mg/m ² 1瓶	○	○								
	内服	時間：_____			カナール ホパラミン	500mg/day 2mg/day	○									

地方独立行政法人 新小山市市民病院