

化学療法レジメン

レジメン名	【消】FOLFIRI
レジメンの概要	胃癌、大腸癌
投与量設定	レボレチート 200mg/m ² (day1)、イリリカ 150mg/m ² (day1)、フルオウラシル 400mg/m ² (bolus)(day1)、2400mg/m ² (46hr)(day1-2)
インターバル日数	14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

診療科名	消化器
管理コード	100010

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○									
					パロリト点静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	CVポート 側管	時間： 2時間	イリリカと同時投与		レボレチート注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
4	CVポート メイン	時間： 2時間	レボレチートと同時投与	●	イリリカ注	150mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
5	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
6	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										