

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+DEX(3-6クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(注射) カイ° 013(カルフィルゾミブ) 56mg/m²(day1,2,8,9,15,16)、ダラキ1-0(ダラツムマブ,ホ®ルビアル0ニダ-セ® アルファ) 1瓶(day1,15)

投与量設定(内服) レナデックス(デキサメタゾン) 20mg/day(day1,2,8,9,15,16)40mg/body(day22)、

診療科名 血液
管理コード 200092

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 8	Day 9	...	Day 15	Day 16	...	Day 22
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★レナデックス,加ナール,ホ®ラミン,モンテルカスト内服 (カイ° 013及びダラキ1-0投与 1 時間前までに)★		ブドウ糖液5%(100mL)	1袋	○	○		○	○		○	○		
2	点滴静注	時間 : 30分	全量100mLに調製 注射用水の欄:total量を記載	●	カイ° 013注	56mg/m ²	○	○		○	○		○	○		
					注射用水(100mL)	1瓶										
					ブドウ糖液5% (希釈用)	1瓶										
3	皮下注射	時間 : _____	臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキ1-0注	1瓶	○						○			
	内服	時間 : _____			レナデックス	20mg/day	○	○		○	○		○	○		
	内服	時間 : _____			レナデックス	40mg/day										○
	内服	時間 : _____			加ナール	500mg/day	○						○			
					ホ®ラミン	2mg/day										
					モンテルカスト	10mg/day										

地方独立行政法人 新小山市市民病院