

化学療法レジメン

レジメン名 【消】トラスツズマブ+XP(1クール目)

レジメンの概要 HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(点滴) トラスツズマブ 8mg/kg(day1)、シタラチン 60mg/m²(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) セローダ[®](カ[®]シタ[®]ベン[®]) C法2400-4200mg/day1日2回(day1-14) ※セローダ[®]：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100085 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	...	Day 14			
1	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管		○ 6:00							
2	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間			大塚生食注(500mL袋)	1袋		○ 7:30							
3	点滴静注 末梢メイン	時間：30分			デキサ [®] 注射液6.6mg	1.5瓶		○ 8:30							
4	点滴静注 末梢側管	時間：30分			デキサ [®] 注射液6.6mg	1瓶			○ 10:00	○ 10:00					
5	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分	初回8mg/kg 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	8mg/kg		○ 9:00							
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
6	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			マニトールS注射液300mL	1袋		○ 10:30							
7	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シタラチン注	60mg/m ²		○ 12:30	積算値チェック						
8	点滴静注 末梢側管	時間：2時間			生理食塩液（希釈用）	1袋		○ 14:30	○ 10:30	○ 10:30					
9	点滴静注	時間：4時間			リネ [®] 注 500mL	1袋	○ 17:00								
10	点滴静注 末梢側管	時間：2時間			フィオ [®] 140輸液 500ml	1袋		○ 16:30	○ 12:30	○ 12:30					
11	点滴静注 末梢側管	時間：2時間			リネ [®] 3A輸液(500mL)	1袋		○ 18:30	○ 14:30	○ 14:30					
12	点滴静注 末梢メイン	時間：	ルートフラッシュ		生食液NS 20mL	1管		○ 20:30	○ 16:30						
13	点滴静注	時間：4時間			リネ [®] 3A輸液(500mL)	1袋	○ 21:00								
14	点滴静注	時間：5時間			生理食塩液(500mL袋)	1袋	○ 1:00								
	内服	時間：		●	セローダ [®]	2400-4200mg/day		○	...	...	...	○			

【セローダ】

地方独立行政法人 新小山市民病院

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。

これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg
1.96m ² 以上	2,100mg