

化学療法レジメン

レジメン名【消】ペムプロリズマブ+GEM

レジメンの概要治癒切除不能な胆道癌

診療科名消化器

投与量設定キイトルダ(ペムプロリズマブ) 200mg/body(day1)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)

管理コード100215

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8						
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : _____	ルートkeep用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
			フラッシュ用												
			フィルターライン使用												
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ注	200mg/body	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注 末梢メイン	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	0.5瓶	○		○						
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○		○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									