

化学療法レジメン

レジメン名 【消】GEM+CDDP+S-1
レジメンの概要 切除不能または再発胆道癌

投与量設定(点滴) シスプラチン 25mg/m²(day1)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1)
投与量設定(内服) ティーエスワン(テガフル・ギマシル・チカラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-7) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day8朝
診療科名 消化器
管理コード 100136 インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 7							
1	点滴静注 末梢メイン	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注 末梢メイン	時間：15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○									
					パロメトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分	積算値チェック	●	シスプラチン注	25mg/m ²	○									
					大塚生食注(500mL袋)	1袋										
4	点滴静注 末梢メイン	時間：30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶										
5	点滴静注 末梢側管	時間：1時間30分	ゲムシタビンと同時に 側管より		硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○									
					リルーゲンF注 500mL	1袋										
	内服	時間：_____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	○							

【ティーエスワン】

E法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、7日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回