

化学療法レジメン

レジメン名【消】ペムプロリズマブ+SOX

レジメンの概要治癒切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陰性）

投与量設定(点滴)キイトルダ（ペムプロリズマブ） 200mg/body(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

診療科名消化器投与量設定(内服)ティーエスワン(テガフル・ギメラシル・オキサリルK) 40mg/m²/回 1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード100213インターバル日数21（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14							
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ 注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○									
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg グラセトリン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○									
5	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン 注 ブドウ糖液5%（希釈用）	130mg/m ² 1袋	○									
	内服	時間：_____		●	ティーエスワン	40mg/m ² /回 1日2回	○	...	○							

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回