

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】トラスツズマブ+DTX(60mg m²)(2クール目以降)

レジメンの概要 乳癌 (3週1回施用) 2回目以降用

診療科名 乳腺 投与量設定 トセタセル 60mg/m²(day1)、トラスツズマブ 6mg/kg(day1)

管理コード 150065 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「ﾌｧｰ」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間 : 1時間		●	トセタセル注	60mg/m ²	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	6mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									