

化学療法レジメン

レジメン名【血】《レボホリナート代替》SMILE

レジメンの概要NK細胞リンパ腫、NKT細胞リンパ腫

投与量設定キトセド(キトセド)2000mg/m²(day1)、ロミテグ(ミナ)300mg/m²×3(day2-4)、イマテド(イマテド) 1500mg/m²(day2-4)、イトナド 100mg/m²(day2-4)、

診療科名血液

管理コード201003インターバル日数28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 72時間前からST合剤中止、ループ利尿薬・NSAIDsはMTX感受度以下まで併用禁忌、胸水発症症例は投与注意

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 10	Day 12	Day 14	Day 16	Day 18	Day 20
1	点滴静注	時間： 6時間			メロニ静注7%	2管	○											
					リルデム3A輸液(500mL)	1袋	9:00											
2	点滴静注	時間： 6時間			メロニ静注7%	2管	○											
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	15:00											
3	点滴静注	時間： 6時間			メロニ静注7%	2管	○											
					リルデム3A輸液(500mL)	1袋	21:00											
4	点滴静注	時間： 6時間			メロニ静注7%	2管	○											
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	3:00											
5	点滴静注 末梢側管	時間：	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	点滴静注 末梢メイン	時間： 8時間			メロニ静注7%	2管		○										
					大塚生食注(1000mLリフトバツク)	1袋	9:00											
7	点滴静注 末梢側管	時間： 30分			アロカス点滴静注235mg	1瓶		○										
					バロメロ点滴静注0.75mg 50mL	1袋	11:30											
8	点滴静注 末梢側管	時間： 6時間	全量500mLに調製	●	キトセド注	2000mg/m ²		○										
					生理食塩液(希釈用)	1袋	12:00											
9	側管静注	時間：	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		タマテグ注	0.5瓶		○										
					大塚生食注(20mL)	0.25管	15:00											
10	点滴静注 末梢メイン	時間： 8時間			メロニ静注7%	2管		○										
					大塚生食注(1000mLリフトバツク)	1袋	17:00											
11	側管静注	時間：	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		タマテグ注	0.5瓶		○										
					大塚生食注(20mL)	0.25管	21:00											
12	点滴静注 末梢メイン	時間： 8時間			メロニ静注7%	2管		○										
					大塚生食注(1000mLリフトバツク)	1袋	1:00											
13	側管静注	時間：	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		タマテグ注	0.5瓶		○										
					大塚生食注(20mL)	0.25管	3:00											
14	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	5瓶			○	○	○							
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶			10:15	10:15	10:15							
15	点滴静注	時間： 15分	イホマイド注15分前		ロミテグ注	300mg/m ²			○	○	○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶			10:45	10:45	10:45							
16	点滴静注	時間： 2時間		●	イマテド注	1500mg/m ²			○	○	○							
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	11:00	11:00	11:00									
17	側管静注	時間：	生食20mLで溶解し6mL採取		レホホリナート注25mg	0.3瓶				○	○							
					生食液NS 20mL	0.3管			12:00	12:00								
18	点滴静注	時間： 2時間	※体表面積2㎡を超える 場合は50倍希釈する	●	イトナド注	100mg/m ²			○	○	○							
					大塚糖液5%(500mLリフトバツク)	1袋	13:00	13:00	13:00									
19	点滴静注	時間： 15分	イホマイド注開始4時間後		ロミテグ注	300mg/m ²			○	○	○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶			15:00	15:00	15:00							
20	側管静注	時間：	キトセド投与開始30時間後より開始 生食20mLで溶解し6mL採取		レホホリナート注25mg	0.3瓶			○	○	○							
					生食液NS 20mL	0.3管			18:00	18:00	18:00							
21	点滴静注	時間： 15分	イホマイド注開始8時間後		ロミテグ注	300mg/m ²			○	○	○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶			19:00	19:00	19:00							
22	側管静注	時間：	生食20mLで溶解し6mL採取		レホホリナート注25mg	0.3瓶			○	○	○							
					生食液NS 20mL	0.3管			0:00	0:00	0:00							
23	側管静注	時間：	生食20mLで溶解し6mL採取		レホホリナート注25mg	0.3瓶			○	○	○							
					生食液NS 20mL	0.3管			6:00	6:00	6:00							
24	点滴静注	時間： 30分			リル・コーラ注射液100mg	1瓶						○	○	○	○	○	○	○
					グロメロ点滴静注0.75mg 50mL	1袋						10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
25	皮下注射	時間：		●	ロイセ注	1瓶	本剤5000KUを注射用水2mLで溶解後、生理食塩液にて全量5mLとする。このうち0.1mLを取り生理食塩液で全量1mLとした後、このうちの0.1mLを皮下注射					○						
					注射用水PL「フー」(20mL)	1瓶						11:00						
					生理食塩水	1瓶												
26	点滴静注	時間： 4時間		●	ロイセ注	6000KU/m ²						○	○	○	○	○	○	○
					注射用水PL「フー」(20mL)	1瓶						12:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
					大塚糖液5%(500mLリフトバツク)	1袋												