

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ペムプロリズマブ+CapeOX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌（HER2陰性）

投与量設定(点滴) キイトルダ（ペムプロリズマブ） 200mg/body(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ゼロダ（カペシチン） 1000mg/m²/回 1日2回(day1-14) ※ゼロダ：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100212 インターバル日数 21 （Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：30分	フィルターライン使用	●	キイトルダ 注 生理食塩液PL「フー」 50mL	200mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間：15分			デキサメタゾン注射液6.6mg グラセトリ点注静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
5	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%（希釈用）	130mg/m ² 1袋	○								
	内服	時間：_____		●	ゼロダ 1000mg/m ² /回 1日2回		○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ゼロダ】

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1,200mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg
1.96m ² 以上	2,100mg