

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】トラスツズマブ+GEM(1クール目)

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 ゲムシタビン 1250mg/m²(day1,8) 、トラスツズマブ 4mg/kg(day1)、2mg/kg(day8,15)

管理コード 150105

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day15						
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	0.5瓶	○	○							
					生理食塩液PL「ﾌｧｰ」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間 : 30分		●	ゲムシタビン注	1250mg/m ²	○	○							
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間 : 1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	4mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
5	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	2mg/kg		○	○						
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									