

化学療法レジメン

レジメン名		【消】《点滴》トラスツズマブ+ペルツズマブ(2クール目以降)										
レジメンの概要		がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌										
診療科名	消化器	投与量設定	トラスツズマブ 6mg/kg(day1)、ハﾟｰｼﾞｴﾀ(ﾊﾟﾙツｽﾞﾏﾌﾞ) 420mg/body(day1)									
管理コード	100158	インターバル日数	21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)									

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	6mg/kg	○									
					注射用水(100mL)	1瓶										
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										
3	点滴静注	時間 : 30分		●	ハﾟｰｼﾞｴﾀ注	420mg/body	○									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										