

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ラムシルマブ+FOLFIRI

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

診療科名 消化器

投与量設定 サイラムザ® (ラムシルマブ) 8mg/kg(day1)、イリリテカン 150mg/m²(day1)、レボ レチナート 200mg/m²(day1)、フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

管理コード 100017

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○									
					ホーラン注5mg	2管										
					パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	CVポート メイン	時間： 30分	全量250mLに調製 フィルターライン使用 初回は1時間	●	サイラムザ® 注	8mg/kg	○									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋										
4	CVポート 側管	時間： 2時間	イリリテカンと同時投与		レボ レチナート注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
5	CVポート メイン	時間： 2時間	レボ レチナートと同時投与	●	イリリテカン注	150mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
6	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フソ」 50mL	1瓶										
7	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										