

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ダラツムマブ+VMP(1クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫

投与量設定(注射) ダラキ-0(ダラツムマブ,ホ`ルアルビタ-セ` アルファ) 1瓶(day1,8,15,22,29,36)、ホ`ルテゾミブ` 1.3mg/m²(day1,8,15,22,29,36)

投与量設定(内服) ミルファラン(アルケラン) 9mg/m²(day1-4)、プレドニン(プレドニゾン) 60mg/m²(day2-4)、レテ`ックス(テ`キサメタゾン) 20mg/day(day1,8,15,22,29,36)、

加ナール(アピタミノフェン) 500mg/day(day1,8,15,22,29,36)、ホ`ララミン(d-加ルピエラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22,29,36)

診療科名 血液

管理コード 200041

インターバル日数 42 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	...	Day 4	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 22	...	Day 29	...	Day 36
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★レテ`ックス,加ナール,ホ`ララミン内服 (ダラキ-0投与 1 時間前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○													
2	皮下注射	時間 : _____	★レテ`ックス,加ナール,ホ`ララミン内服 (ダラキ-0投与 1 時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキ-0注	1瓶	○					○		○		○		○		○
3	皮下注射	時間 : _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ホ`ルテゾミブ` 注 生食液NS 20mL	1.3mg/m ² 1管	○					○		○		○		○		○
	内服	時間 : _____			レテ`ックス 加ナール ホ`ララミン	20mg/day 500mg/day 2mg/day	○					○		○		○		○		○
	内服	時間 : _____		●	ミルファラン	9mg/m ²	○	...	...	○										
	内服	時間 : _____			プレドニン	60mg/m ²		○	...	○										