

化学療法レジメン

レジメン名 【血】ダラツムマブ+Rd(1-2クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫

投与量設定(注射) ダラキ-0(ダラツムマブ,ホリルアルビターゼ アルファ) 1瓶(day1,8,15,22)

投与量設定(内服) レバミト(レリトミト) 25mg/day(day1-21)、レテックス(デキサメタゾン) 40mg/day(day1,8,15,22)、

診療科名 血液

加ナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,8,15,22)、ホラミン(d-クルフェニミンマリン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)

管理コード 200037

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★レテックス,加ナール,ホラミン内服 (ダラキ-0投与1時間前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○							
2	皮下注射	時間：_____	★レテックス,加ナール,ホラミン内服 (ダラキ-0投与1時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキ-0注	1瓶	○		○		○			○
	内服	時間：_____			レテックス	40mg/day	○		○		○			○
					加ナール	500mg/day								
					ホラミン	2mg/day								
	内服	時間：_____		●	レバミト	25mg/day	○	...	...	...	...	...	○	