

化学療法レジメン

レジメン名【消】ニボルマブ+SOX

レジメンの概要治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(点滴)オゾジール(ニボルマブ) 360mg/body(day1)、オキサリプラチン 130mg/m²(day1)

診療科名消化器投与量設定(内服)ティーエスワン(テガフル・ギメラシル・オキサシルK) 40mg/m²/回 1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝

管理コード100203インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	オゾジール注 生理食塩液（希釈用）	360mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注	時間：15分			デキサト注射液6.6mg グラコビトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
4	点滴静注	時間：2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%（希釈用）	130mg/m ² 1袋	○								
	内服	時間：_____		●	ティーエスワン	40mg/m ² /回 1日2回	○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回