

化学療法レジメン

レジメン名 【泌】GEM+CBDCA

レジメンの概要 膀胱癌・腎盂尿管癌

投与量設定(点滴) ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)、カルボプラチン AUC=3~4,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

診療科名 泌尿器 投与量設定(内服) アプロピタト 125mg(day1) 80mg(day2,3)

管理コード 300010 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 3	...	Day 8				
1	点滴静注 末梢メイン	時間： 3時間			リリゲンF注 500mL	1瓶	○ 10:00				○ 10:00				
2	点滴静注 末梢側管	時間： 30分	★アプロピタト内服(3日間連投 1日目:カルボプラチン投与1~1.5時間前 2日目以降:午前中)★		デキサト注射液6.6mg	1瓶	○ 10:00								
					グラセトの点滴静注パック 1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注 末梢側管	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	0.5瓶					○ 10:00				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注 末梢側管	時間： 30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○ 11:00				○ 11:00				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
5	点滴静注 末梢側管	時間： 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=3~4	○ 11:30								
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋									
6	点滴静注 末梢メイン	時間： 3時間			リリゲンF輸液(500mL)	1袋	○ 13:00								
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 3時間			リリゲンF注 500mL	1瓶	○ 16:00								
	内服	時間：			アプロピタト		○ 125mg	○ 80mg	○ 80mg						