

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】《皮下》トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX(2クール目以降)

レジメンの概要 乳癌

診療科名 乳腺 投与量設定 ファスコ<sup>®</sup> MA(パ<sup>®</sup> ルツス<sup>®</sup> マブ<sup>®</sup> 600mg/body、トラスツス<sup>®</sup> マブ<sup>®</sup> 600mg/body)(day1)、ドセタセ<sup>®</sup>ル 75mg/m<sup>2</sup>(day1)

管理コード 150072 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間       | 用法・その他                                                                                    | 癌 | 薬品名称                  | 用量/単位               | Day 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間 : _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用                                                                        |   | 大塚生食注(100mL瓶)         | 1瓶                  | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 皮下注射    | 時間 : _____ | 大腿部に皮下投与<br><small>前回の注射部位から2.5cm以上離すこと<br/>本剤10mLを5分以上かけて投与<br/>投与終了後15分の経過観察を行う</small> | ● | ファスコ <sup>®</sup> 注MA | 1瓶                  | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間 : 15分   |                                                                                           |   | デキサト注射液6.6mg          | 1瓶                  | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                                                                           |   | 生理食塩液PL「フー」 50mL      | 1瓶                  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 点滴静注    | 時間 : 1時間   |                                                                                           | ● | ドセタセ <sup>®</sup> ル注  | 75mg/m <sup>2</sup> | ○     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |         |            |                                                                                           |   | 大塚生食注(250mL袋)         | 1袋                  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |