

化学療法レジメン

レジメン名	【消】FP
レジメンの概要	食道癌、胃癌
診療科名	消化器
管理コード	100095
投与量設定	ｼｽﾎﾟﾗﾁﾝ 80mg/m ² (day1)、ﾌﾙｵｸﾗｼﾙ 800mg/m ² (day1-5)
インターバル日数	28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○ 6:00								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋	○ 7:30								
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分			ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1.5瓶	○ 8:30								
					ｱｵｶﾘﾝ点滴静注235m g	1瓶									
					ﾊﾟﾛﾘｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分			ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1瓶		○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00				
					生理食塩液PL「ﾌｰｰ」 50mL	1瓶									
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間			ﾏﾆﾁﾄｰﾙS注射液300mL	1袋	○ 9:00								
6	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	ｼｽﾎﾟﾗﾁﾝ注	80mg/m ²	○ 11:00	積算値チェック							
					生理食塩液（希釈用）	1袋									
7	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間			ﾘｳｴｰﾝF注 500mL	1袋	○ 13:00	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30				
8	点滴静注 末梢メイン	時間 : 24時間		●	ﾌﾙｵｸﾗｼﾙ注	800mg/m ²	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00				
					大塚生食注 1L	1袋									
9	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間			ﾌｨｼﾞｵ140輸液 500ml	1袋	○ 16:00	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30				
10	点滴静注 末梢側管	時間 : 3時間			ﾘﾚﾃﾞﾑ3A輸液(500mL)	1袋	○ 19:00	○ 16:30	○ 16:30	○ 16:30	○ 16:30				