

化学療法レジメン

レジメン名 【消】S-1+DTX
レジメンの概要 胃癌

上限：6クール

診療科名 消化器
管理コード 100073
投与量設定(点滴) トセタセル 40mg/m²(day1)
投与量設定(内服) ティーエスワン(テガフル・ギメラシル・チラシルK) 80-120mg/day 1日2回(day1-14) ※ティーエスワン：通常、day1夕～day15朝
インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14							
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 15分			デキスト注射液6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○	1コース目：S-1のみ（14日間連日投与、7日間休薬） 2コース目よりレジメン適応可能 合計7コース施行								
3	点滴静注	時間： 1時間		●	トセタセル注 大塚生食注(250mL袋)	40mg/m ² 1袋	○									
	内服	時間： _____		●	ティーエスワン	80-120mg/day	○	...	○							

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ティーエスワン】

C法：通常、成人には初回投与量（1回量）を体表面積に合わせて下表の基準量とし、朝食後及び夕食後の1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回