

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ニボルマブ+PTX+CBDCA

上限：3クール

レジメンの概要 非小細胞肺癌における術前補助療法

診療科名 呼吸器

投与量設定 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(ﾆﾎﾙﾏﾌﾞ) 360mg/body(day1)、ﾊﾟｸﾘﾀｹﾙ 200mg/m²(day1)、ｶﾙﾍﾞﾌﾟﾗﾁﾝ AUC=4～6,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード 250231

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 注	360mg/body	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										
4	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「ﾌﾘｰ」 50mL	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分			ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					ﾌｧﾓﾅﾞﾝ注射液20mg	1管										
					ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg	2管										
					ｱﾙｶﾘﾝ点滴静注235m g	1瓶										
					ﾊﾟﾛｼｪﾄﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間： 3時間	フィルターライン使用	●	ﾊﾟｸﾘﾀｹﾙ注	200mg/m ²	○									
					大塚生食注(500mL袋)	1袋										
4	点滴静注	時間： 1時間		●	ｶﾙﾍﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注	AUC=4～6	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトﾊﾞｯｸ)	1袋										

地方独立行政法人 新小山市市民病院