

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ベバシズマブ+Cape

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌における術後補助化学療法

投与量設定(点滴) ヘバシズマブ 7.5mg/kg(day1)

診療科名 消化器 投与量設定(内服) ゼロダ (カプセル) C法2400-4200mg/day1日2回(day1-14) ※ゼロダ：通常、day1夕～day15朝

管理コード 100039 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 14						
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分	全量100mLに調製 初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ヘバシズマブBS注 生理食塩液（希釈用）	7.5mg/kg 1袋	○								
	内服	時間： _____		●	ゼロダ	2400-4200mg/day	○	...	○						

地方独立行政法人 新小山市民病院

【ゼロダ】

C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。
これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1回用量
1.36㎡未満	1,200mg
1.36㎡以上1.66㎡未満	1,500mg
1.66㎡以上1.96㎡未満	1,800mg
1.96㎡以上	2,100mg