

化学療法レジメン

レジメン名 【血】イサツキシマブ+Pd(1クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) サークリサ(イサツキシマブ) 10mg/kg(day1,8,15,22)

投与量設定(内服) ホﾟマリスト(ホﾟマリトﾞミﾄﾞ) 4mg/day(day1-21)、レナデックス(デナマタグﾞン) 20-40mg/day(day1,8,15,22)、

診療科名 血液

加ナール(アトアミノフィン) 500mg/day(day1,8,15,22)、ホﾟラミン(d-クルルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)

管理コード 200200

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22	
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★レナデックス,加ナール,ホﾟラミン内服 (サークリサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○			○	
2	点滴静注	時間 : <u>3時間20分</u>	全量250mLに調製 フィルターライン使用 60分以降 : 30分ごとに25mL/hずつ増量可 ※最大150mL/hまで	●	サークリサ注	10mg/kg									
		時間 : <u>1時間53分</u>	0-60分 : 25mL/h 30-60分 : 100mL/h 60分以降 : 200mL/h		生理食塩液 (希釈用)	1袋	○								
		時間 : <u>1時間15分</u>	200mL/hで投与						○					○	
	内服	時間 : _____		●	ホﾟマリスト	4mg/day	○	...	...	...	...	...	○		
	内服	時間 : _____			レナデックス	20-40mg/day	○		○		○			○	
	内服	時間 : _____			加ナール	500mg/day	○		○		○			○	
					ホﾟラミン	2mg/day									

地方独立行政法人 新小山市民病院