

化学療法レジメン

レジメン名 【泌】GEM+CDDP

レジメンの概要 進行期膀胱癌・腎盂癌・尿管癌 3次治療

投与量設定(点滴) ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)、シスプラチン 70mg/m²(day1)

診療科名 泌尿器

投与量設定(内服) アプロピタト 125mg(day1) 80mg(day2,3)

管理コード 300005

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	...	Day 8		
1	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間			リユゲンF注 500mL	1瓶	○ 9:15	○ 6:00 (6時間)	○ 6:00 (8時間)	○ 6:00 (8時間)	○ 6:00 (8時間)		○ 9:15		
2	点滴静注 末梢側管	時間： 15分	★アプロピタト内服(3日間連投 1日目:シスプラチン投与1～1.5時間前 2日目以降:午前中)★		ドセタール注射液20mg	0.5管	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00						
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 15分			ドセタール注射液6.6mg	1.5瓶	○ 11:15								
					バロレロン点滴静注バグ 0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注 末梢側管	時間： 15分			ドセタール注射液6.6mg	1瓶		○ 11:15	○ 11:15	○ 11:15					
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
5	点滴静注 末梢メイン	時間： 15分			ドセタール注射液6.6mg	0.5瓶							○ 11:15		
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
6	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分		●	ゲムシタビン注[GEM]	1000mg/m ²	○ 11:30						○ 11:30		
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 3時間			リルテム3A輸液(500mL)	1袋							○ 12:00		
8	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	70mg/m ²	○ 12:00	積算値チェック							
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
9	点滴静注 末梢メイン	時間：	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
10	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リルテム3A輸液(500mL)	1袋	○ 14:00	○ 12:00 (6時間)	○ 14:00 (8時間)	○ 14:00 (8時間)	○ 14:00 (8時間)				
11	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リユゲンF注 500mL	1瓶	○ 19:00	○ 18:00 (6時間)	○ 22:00 (8時間)	○ 22:00 (8時間)					
12	点滴静注 末梢側管	時間： 15分			ドセタール注射液20mg	0.5管	○ 20:00	○ 20:00							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
13	点滴静注 末梢メイン	時間： 6時間			リルテム3A輸液(500mL)	1袋	○ 0:00	○ 0:00							
	内服	時間：			アプロピタト		○ 125mg	○ 80mg	○ 80mg						