

化学療法レジメン

レジメン名 【血】エロツズマブ+Rd(1-2クール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定(点滴) IΔ7°リシテイ(IΔツズマブ) 10mg/kg(day1,8,15,22)

レバラミト(レナリトミト) 25mg(day1-21)、レテックス(デキサメタゾン) 28mg(day1,8,15,22)、

診療科名 血液

投与量設定(内服) カナール(アトアミノフィン) 500mg(day1,8,15,22)、ホ°ラミン(d-グルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1,8,15,22)

管理コード 200057

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15	...	Day 21	Day 22	
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★カナール,ホ°ラミン内服 (IΔ7°リシテイ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1管	○		○		○			○	
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○		○		○			○	
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間 : 45分			大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○			○	
4	点滴静注	時間 : _____	フィルターライン使用 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:25mg/mL 必要量を抜き取り希釈 ※速度注意(変速) 初回: 30mL/h(30分) →60mL/h(30分) →残り120mL/h 2回目: 180mL/h(30分) →残り240mL/h 3回目以降:300mL/h	●	IΔ7°リシテイ注	10mg/kg	○		○		○			○	
					注射用水(100mL7°プラスチックボトル)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
	内服	時間 : _____			レテックス	28mg/day	○		○		○			○	
					カナール	500mg/day									
					ホ°ラミン	2mg/day									
	内服	時間 : _____		●	レバラミト	25mg/day	○	...	...	...	...	...	○		