

化学療法レジメン

レジメン名【消】FOLFIRINOX

レジメンの概要治癒切除不能な膵癌

診療科名消化器

投与量設定

管理コード100016

インターバル日数14（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	CVポート メイン	時間： _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	CVポート メイン	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アカリ点静注235m g	1瓶										
					パロノセリン点静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	CVポート メイン	時間： 2時間	全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注	85mg/m ²	○									
					ブドウ糖液5%（希釈用）	1袋										
4	CVポート 側管	時間： 2時間	オキサリプラチンと同時投与		パロノセリン注	200mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
5	CVポート メイン	時間： 2時間	パロノセリンと同時投与	●	オキサリプラチン注	180mg/m ²	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										
6	CVポート メイン	時間： 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²	○									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶										
7	CVポート メイン	時間： 46時間	携帯型デバイス注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²	○									
					生理食塩液（希釈用）	1瓶										