

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ゾルベツキシマブ+FOLFOX6(1クール目)

レジメンの概要 CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

投与量設定(点滴) ビ`ロイ(ゾ`ルベツキシマブ) 800mg/m²、レボ`ルナト 200mg/m²(day1)、オキサリプラチン 85mg/m²(day1)、フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1)、2400mg/m²(46hr)(day1-2)

診療科名 消化器

投与量設定(内服) ジブ`レサ(オラザ`ピン) 5mg/day1日1回夕食後(day0-5)

管理コード 100006

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	...	Day 5					
1	CVポート メイン	時間: _____	埋込式ルート 穿針時用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○							
2	CVポート メイン	時間: 30分			デキスト注射液6.6mg	1.5瓶		○							
					アカリ点静注235mg	1瓶									
					ホ`ラミン注5mg	2管									
					バ`ロ/レト`ン点滴静注バ`ック0.75mg 50mL	1袋									
3	CVポート メイン	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶		○							
4	CVポート メイン	時間: _____	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 2.0mg/mLに希釈調製して使用 0-30分: 75mL/h 30-60分: 150mL/h 60分以降: 200mL/h	●	ビ`ロイ注	800mg/m ²		○							
					注射用水(100mL)	1瓶									
					生理食塩液 (希釈用)	mL									
5	CVポート メイン	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶		○							
6	CVポート 側管	時間: 2時間	オキサリプラチンと同時投与		レボ`ルナト注	200mg/m ²		○							
					大塚糖液5%(250mLソフトバ`ック)	1袋									
7	CVポート メイン	時間: 2時間	レボ`ルナトと同時投与 全量250mLに調製	●	オキサリプラチン注	85mg/m ²		○							
					バ`ド`ウ糖液5% (希釈用)	1袋									
8	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	フルオウラシル注	400mg/m ²		○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
9	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル注	2400mg/m ²		○							
					生理食塩液 (希釈用)	1瓶									
	内服	時間: _____			ジブ`レサ	5mg/day	○	...	...	○					