

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】《点滴》トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン(1クール目)

レジメンの概要 手術不能又は再発乳癌

診療科名 乳腺 投与量設定 トラスツズマブ 8mg/kg(day1)、パージェタ(ペルツズマブ) 840mg/body(day1)、エリブリン 1.4mg/m²(day1,8)

管理コード 150116 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間 : 1時間30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	8mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
3	点滴静注	時間 : 1時間		●	パージェタ注	840mg/body	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間 : 5分	全開で	●	エリブリン注	1.4mg/m ²	○	○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									