

化学療法レジメン

レジメン名 【耳】セツキシマブ+FP(2クール目以降)

レジメンの概要 頭頸部癌

診療科名 耳鼻咽喉

投与量設定 アービタックス(セツキシマブ) 250mg/m²(day1,8,15)、シプロラチン 80mg/m²(day1)、フル和ワラシル 800mg/m²(day1-5)

管理コード 400031

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 8	Day 15		
1	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	6:00								
2	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋	○								
							7:30								
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アカリ点点滴静注235m g	1瓶	8:30								
					ホーラミン注5mg	2管									
					パロセトロン点滴静注パロセトロン0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注	時間：	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶						○	○		
5	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶						○	○		
					ホーラミン注5mg	2管									
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
6	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間	全量250mLに調製	●	アービタックス注	250mg/m ²	○					○	○		
					生理食塩液（希釈用）	1瓶	9:00								
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間	アービタックス投与後 1時間経過観察		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○					○	○		
							10:00								
8	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間			マンニトールS注射液300mL	1袋	○								
							11:00								
9	点滴静注 末梢側管	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶		○	○	○	○				
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶		12:00	12:00	12:00	12:00				
10	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シプロラチン注	80mg/m ²	○	積算値チェック							
					生理食塩液（希釈用）	1袋	13:00								
11	点滴静注 末梢側管	時間： 3時間			リルゲゲンF注 500mL	1袋	○	○	○	○	○				
							15:00	10:30	10:30	10:30	10:30				
12	点滴静注 末梢メイン	時間： 24時間		●	フル和ワラシル注	800mg/m ²	○	○	○	○	○				
					大塚生食注 1L	1袋	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00				
13	点滴静注 末梢側管	時間： 3時間			フィジール140輸液 500ml	1袋	○	○	○	○	○				
							18:00	15:30	15:30	15:30	15:30				
14	点滴静注 末梢側管	時間： 3時間			リルゲゲン3A輸液(500mL)	1袋	○	○	○	○	○				
							21:00	18:30	18:30	18:30	18:30				